

Canser y fron

Mae'r wybodaeth hon ynghylch canser y fron a triniaethau ar gyfer canser y fron.

Ceir esboniad o'r geiriau sydd wedi eu tanlinellu yn y rhestr geiriau ar y diwedd.

Mae'r rhestr geiriau hefyd yn cynnwys ynganiad y geiriau yn Saesneg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr wybodaeth hon, gallwch holi'ch meddyg neu nyrs yn yr ysbyty lle rydych yn cael eich triniaeth.

Gallwch hefyd ffonio Cymorth Cancer Macmillan ar radffôn **0808 808 00 00**, 7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 8pm. Mae gennym gyfeithwyr, felly, gallwch siarad â ni yn eich iaith eich hun. Pan fyddwch yn ein ffonio, dywedwch wrthym yn Saesneg pa iaith yr ydych ei hangen (dywedwch "Welsh").

Mae mwy o wybodaeth am ganser yn Gymraeg yn macmillan.org.uk/translations

Mae'r wybodaeth hon yn trafod:


- Y bronnau
- Canser y fron
- Sut caiff triniaeth ei chynllunio
- Siarad â'ch tîm gofal iechyd
- Cwestiynau i'w gofyn am eich triniaeth
- Triniaethau ar gyfer canser y fron
- Sgîl-effeithiau posibl eich triniaeth
- Gwybodaeth arall
- Dilyniant
- Sut y gall Macmillan eich helpu chi
- Rhestr geiriau
- Mwy o wybodaeth yn Gymraeg
- Cyfeiriadau a diolchiadau

Y bronnau

Mae'r bronnau wedi'u gwneud o fraster a meinwe. Mae ganddynt hefyd chwarennau lle gwneir llaeth y fron. Maent wedi eu cysylltu â'r deth drwy diwbiau mân a elwir yn ddwythellau llaeth. Mae gan ddynion ychydig o feinwe bron tu ôl i'r deth.

Mae meinwe'r fron a nodau lymff (chwarennau) yn y ceseiliau. Mae nodau lymff yn rhan o'r system lymffatig. Mae gennym nodau lymff hefyd ger asgwrn y fron a'r tu ôl i bont yr ysgwydd.

Golwg o'r fron o'r ochr




Y nodau lymff ger y bronnau

Nodau lymff
y tu ôl i bont yr
ysgwydd

Nodau lymff yn
y gesail

Llestri
lymff



Canser y fron

Mae meinwe'r corff wedi'i wneud o gelloedd bach. Mae canser y fron yn digwydd pan fo'r celloedd yn y fron yn tyfu'n afreolus ac yn ffurfio lwm a elwir yn diwmor (canser cychwynnol). Weithiau mae celloedd canser yn lledaenu i rannau eraill o'r corff trwy'r gwaed a'r system lymffatig. Gelwir hyn yn ganser eilaidd.

Mae gwahanol fathau o ganser y fron ond maent i gyd yn cael eu trin mewn ffordd debyg. Mae canser y fron yn effeithio'n bennaf ar ferched. Gall dynion ei gael hefyd, ond mae hyn yn brin.

Nid yw canser y fron yn heintus ac ni ellir ei basio i bobl eraill.

Camau a graddau canser y fron

- Mae cam y canser yn golygu pa mor fawr ydyw ac os yw wedi lledaenu.
- Gradd y canser yw pa mor gyflym y gallai'r canser dyfu.

Derbynyddion

Mae gan rai celloedd canser y fron dderbynyddion y gall hormonau neu broteinau lynu atynt. Gall y rhain wneud y canser dyfu.

- **Hormonau** – mae gan rai canserau'r fron dderbynyddion ar gyfer yr hormon oestrogen. Gelwir y rhain yn ganserau'r fron positif i dderbynyddion oestrogen (ER positif). Mae triniaethau a elwir yn therapiâu hormonaidd yn gweithio'n dda ar gyfer canser y fron ER positif. Gall canserau'r fron hefyd fod â derbynyddion ar gyfer yr hormon progesteron.
- **Proteinau** – mae gan rai canserau'r fron ormod o'r protein HER2 ar arwyneb y celloedd. Gelwir y rhain yn ganserau'r fron HER2 positif. Efallai bydd eich doctor yn rhoi trastuzumab i chi ar gyfer y math yma o ganser. Mae hwn yn perthyn i grŵp o gyffuriau a elwir yn therapiâu targedig.

Canser y fron negyddol triphlyg

Gelwir canser y fron heb ddim derbynyddion ar gyfer hormonau neu broteinau yn ganser y fron negyddol triphlyg.

Mae gan 1 ym mhob 5 o ferched â chanser y fron (20%) ganser y fron negyddol triphlyg. Mae'n fwy cyffredin ymysg merched iau. Gall eich meddyg neu nyrs ddweud mwy wrthych chi am hyn.

Sut caiff triniaeth ei chynllunio

Bydd eich tîm gofal iechyd yn cyfarfod i gynllunio'r driniaeth orau i chi. Bydd eich nyrs neu feddyg yn siarad â chi am:

- gam a gradd y canser
- os oes gan y canser dderbynyddion hormon neu brotein
- eich iechyd cyffredinol
- y triniaethau a'r sgîl-effeithiau posibl
- yr hyn yr ydych yn ei feddwl am y triniaethau sydd ar gael.

Siarad â'ch tîm gofal iechyd

Mae'n bwysig eich bod yn trafod unrhyw driniaeth â'ch meddyg, i wneud yn siŵr eich bod yn deall beth mae'n ei olygu. Ar ôl siarad gyda chi, fel arfer bydd eich meddyg yn gofyn i chi lofnodi ffurflen i ddangos eich bod yn deall ac yn cytuno i gael y driniaeth. Gelwir hyn yn rhoi eich caniatâd. Ni fyddwch yn cael unrhyw driniaeth oni bai eich bod wedi cytuno i'w chael.

Mae'n syniad da mynd â rhywun gyda chi sy'n gallu siarad Cymraeg a Saesneg. Neu gall yr ysbty drefnu cyfeithydd ar eich cyfer. Rhowch wybod i'ch nyrs os ydych angen un.

Cwestiynau i'w gofyn am eich triniaeth

- Beth mae fy niagnosis yn ei olygu?
- Beth yw cam a gradd y canser?
- Beth fydd fy nhriniaeth?
- Beth yw manteision, risgiau a sgîl-effeithiau pob triniaeth?
- A fydd y driniaeth yn effeithio ar fy mywyd dyddiol?
- Gyda phwy allaf i siarad am sut ydw i'n teimlo?

Mae gennym fwy o wybodaeth yn eich iaith ynghylch cael diagnosis o ganser.

Triniaethau ar gyfer canser y fron

Mae'r triniaethau ar gyfer canser y fron yn cynnwys:

- llawdriniaeth (llawfeddygaeth)
- cyffuriau (cemotherapi, therapi hormonaidd, therapi targedig)
- radiotherapi.

Mae llawer o bobl yn cael mwy nag un math o driniaeth, megis llawdriniaeth ac yna radiotherapi. Neu efallai y cewch gemotherapi cyn neu ar ôl llawdriniaeth.

Llawdriniaeth

Mae llawdriniaeth (llawfeddygaeth) i dynnu'r canser yn driniaeth gyffredin ar gyfer canser y fron. Mae'r meddyg yn tynnu'r canser ac ychydig o feinwe iach o'i amgylch. Bydd y llawdriniaeth a gewch yn dibynnu ar faint y canser, ble mae yn y fron a beth sy'n well gennych.

Mae'n bosib y bydd y meddyg yn siarad â chi am gael llawdriniaeth i dynnu:

- y canser (echdoriad lleol llydan)
- y fron gyfan (mastectomy).

Mae rhai pobl hefyd yn cael llawfeddygaeth i wneud siâp bron newydd (adluniad o'r fron) yn ystod y llawdriniaeth. Mae eraill yn dewis gwneud hyn yn ddiweddarach. Gallwch siarad â'ch meddyg ynghylch hyn a'r gwahanol ffyrdd o'i wneud. Os na chwech adlunio'r fron, gall eich nyrs roi bron artiffisial (prosthesis) i chi i'w rhoi yn eich bra.

Gwirio'r nodau lymff

Yn ystod y llawdriniaeth, bydd y meddyg fel arfer yn tynnu rhai nodau lymff. Maent yn eu tynnu o dan eich braich ar yr un ochr â'r canser. Mae hyn i wirio os oes canser yn y nodau lymff. Mae hyn yn helpu'r meddyg i benderfynu os ydych angen mwy o driniaeth. Bydd y meddyg neu nyrs yn esbonio sut bydd y nodau lymff yn cael eu tynnu.

Os yw unrhyw rai o'r nodau'n cynnwys canser, efallai byddwch yn cael cynnig llawdriniaeth i dynnu'r holl nodau lymff sy'n weddill. Gall rhai merched gael radiotherapi i'r nodau lymff yn hytrach na llawfeddygaeth.

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg sy'n egluro sut y mae llawfeddygaeth yn cael ei chynllunio a beth i'w ddisgwyl ar ôl y llawdriniaeth.

Radiotherapi

Mae radiotherapi yn defnyddio pelydrau X ynni uchel i ddinistrio'r celloedd canser. Gall ddifrodi celloedd normal hefyd, ond fel arfer maent yn gwella ar ôl i'r driniaeth orffen.

Yn aml cewch radiotherapi ar ôl llawdriniaeth unwaith bydd y briw wedi gwella. Gall hyn leihau'r risg o'r canser yn dod yn ôl. Ar ôl echdoriad lleol llydan, fel arfer byddwch yn cael radiotherapi ar weddill meinwe'r fron. Weithiau, byddwch yn cael radiotherapi ar ôl mastectomy hefyd.

Efallai byddwch hefyd yn cael radiotherapi ar y gesail i drin unrhyw nodau lymff sy'n weddill.

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg am radiotherapi a rhai o'r sgîl-effeithiau y gallwch eu profi.

Cemotherapi

Mae cemotherapi yn defnyddio cyffuriau gwrth ganser i ddinistrio celloedd canser. Bydd y cyffuriau'n cael eu rhoi mewn i wythien neu gellir eu rhoi fel tabled. Gall cael cemotherapi leihau'r risg y daw canser y fron yn ôl.

Efallai bydd eich meddyg yn eich cynghori i gael cemotherapi os:

- yw'r canser yn fawr
- yw'r canser wedi lledaenu i'r nodau lymff
- yw'r canser yn radd uchel
- oes gennych chi ganser y fron negyddol triphlyg
- oes gennych chi ganser y fron HER2 positif.

Efallai bydd rhai pobl hefyd yn cael cemotherapi cyn llawfeddygaeth i leihau canser. Mae hyn fel arfer yn golygu mai llawdriniaeth lai sydd ei hangen.

Gall cyffuriau cemotherapi achosi sgîl-effeithiau sy'n gwneud i chi deimlo'n wael. Gall gwahanol gyffuriau achosi gwahanol sgîl-effeithiau, gan gynnwys:

- bod yn fwy tebygol o gael haint.
- teimlo'n flinedig
- teimlo'n sâl neu fod yn sâl
- dolur rhydd neu rwymedd
- ceg ddolorus
- colli gwallt.

Gall eich meddyg siarad â chi am y sgîl-effeithiau y gallech eu cael a sut i'w rheoli. Gellir rheoli'r rhan fwyaf o sgîl-effeithiau gyda chyffuriau. Mae'r rhan fwyaf o sgîl-effeithiau'n diflannu pan fydd y cemotherapi wedi dod i ben.

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg am gemotherapi a rhai o'r sgîl-effeithiau y gallwch eu profi.

Therapi hormonaidd

Os oes gennych ganser derbynnydd-oestrogen positif (ER positif), fel arfer byddwch yn cael therapi hormonaidd. Mae therapiau hormonaidd yn lleihau lefel yr oestrogen neu ei atal rhag glynu wrth y celoedd canser. Fel arfer byddwch yn dechrau therapi hormonaidd ar ôl llawfeddygaeth neu gemotherapi ac yn ei gael am ychydig flynyddoedd.

Mae therapi hormonaidd yn helpu i leihau'r risg y daw canser y fron yn ôl. Mae hefyd yn helpu i leihau'r risg o gael canser newydd y fron yn eich bron arall. Weithiau mae cyffuriau therapi hormonaidd yn cael eu rhoi ar ôl llawfeddygaeth i leihau canser ac osgoi mastectomi. Efallai byddwch yn cael gwahanol gyffuriau, megis tamoxifen, letrozole neu anastrozole. Mae hyn yn dibynnu ar:

- os ydych wedi bod drwy'r cyfnewid ai peidio
- y risg y daw'r canser yn ôl
- sut mae'r sgîl-effeithiau'n debygol o effeithio arnoch.

Mae sgîl-effeithiau therapi hormonaidd yn cynnwys:

- pyliau o wres a chwysu
- poen yn y cymalau
- llai o chwant am ryw.

Atal yr ofariâu rhag gweithio

Os nad ydych chi wedi cael y cyfnewid, mae atal eich ofariâu rhag gweithio yn ddull arall o leihau eich lefelau oestrogen. Mae dwy driniaeth y gellir eu defnyddio i wneud hyn:

- ataliad ofariaidd, sy'n atal yr ofariâu rhag gwneud oestrogen ac yn achosi cyfnewid dros dro
- abladiad ofariaidd, sy'n tynnu'r ofariâu ac yn achosi cyfnewid parhaol.

Byddwch fel arfer yn cael therapi hormonaidd gydag un o'r triniaethau hyn.

Os cewch gynnig un o'r triniaethau hyn i atal eich ofariâu rhag gweithio, bydd eich meddyg yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Os ydych yn poeni am ffrwythlondeb, siaradwch gyda'ch meddyg cyn dechrau triniaeth.

Trastuzumab

Os yw'r canser yn HER2 positif, efallai bydd eich meddyg yn rhoi trastuzumab i chi. Mae hwn yn perthyn i grŵp o gyffuriau a elwir yn therapiâu targedig. Mae Trastuzumab yn atal y protein HER2 rhag gwneud i'r celloedd canser dyfu. Fel arfer byddwch yn cael trastuzumab bob tair wythnos am flwyddyn. Gellir ei roi gyda chemotherapi, neu ar ei ben ei hun. Gall hyn fod cyn neu ar ôl llawfeddygaeth a radiotherapi.

Mae'r sgîl-effeithiau fel arfer yn ysgafn, ond gallant gynnwys:

- cur pen
- tymheredd uchel (gwres) ac oerfel
- teimlo'n sâl.

Efallai byddwch yn cael trastuzumab ar y cyd â chyffur therapi targedig arall o'r enw pertuzumab (Perjeta®) a chyffur cemotherapi. Mae'n bosib y bydd y cyffuriau hyn yn cael eu rhoi cyn llawdriniaeth os oes risg uchel y bydd y canser yn dychwelyd.

Weithiau gall trastuzumab effeithio ar y galon. Byddwch yn cael profion i archwilio'ch calon cyn ac yn ystod y driniaeth.

Bisffosffonadau

Cyffuriau yw Bisffosffonadau y gellir eu defnyddio yn ystod cyfnod cynnar canser y fron i:

- helpu i amddiffyn eich esgyrn rhag effeithiau triniaethau
- lleihau'r risg y daw canser y fron yn ôl.

Mae rhai therapi hormonaidd a chyffuriau cemotherapi yn gallu achosi cyfnewid cynnar, sy'n cynyddu'r risg o'r esgyrn yn teneuo (osteoporosis). Mae'n bosib y bydd eich meddyg yn rhagnodi bisffosffonadau os oes risg y bydd eich esgyrn yn teneuo, neu os yw eich esgyrn eisoes yn teneuo.

Os oes gennych chi ganser y fron cyfnod cynnar, mae bisffosffonadau weithiau'n gallu lleihau'r risg y bydd yn lledaenu i'r esgyrn. Byddwch yn cael bisffosffonadau am 3 i 5 mlynedd. Fe roddir y driniaeth hon fel arfer os oes gennych chi risg uwch o'r canser yn dychwelyd. Gall eich meddyg neu nyrs roi rhagor o wybodaeth i chi.

Sgîl-effeithiau posibl eich triniaeth

Mae gennym ragor o wybodaeth yn Gymraeg am sgîl-effeithiau cyffredin, cemotherapi, radiotherapi a llawfeddygaeth.

Dyma rai sgîl-effeithiau eraill y gallech eu cael yn ystod ac ar ôl triniaeth am ganser y fron.

Newidiadau i'r fron

Gall llawfeddygaeth a radiotherapi ar y fron achosi newidiadau, gan gynnwys:

- sut mae'r fron yn edrych a theimlo
- poen yn y fron ac o dan y fraich
- faint y gallwch symud y fraich a'r ysgwydd ar yr ochr sy'n cael triniaeth.

Ar ôl llawdriniaeth, bydd craith. Fel arfer, daw hon yn llai amlwg dros amser. Gall ymestyn a thylinio'r graith wella hyn.

Ar ôl radiotherapi, efallai bydd croen eich bron yn fwy tywyll ac yn fwy sensitif. Mae'n bwysig gorchuddio'r rhan a defnyddio eli haul gyda Ffactor Amddiffyn o'r Haul (SPF) uchel (o leiaf SPF 30). Holwch eich nyrs neu feddyg am fwy o gyngor.

Os byddwch yn sylwi ar newidiadau i olwg neu deimlad eich bron, mae'n syniad da cael eich meddyg neu nyrs arbenigol i'w gwirio.

Lymffoedema

Lymffoedema yw chwydd a achosir gan hylif yn cranni. Efallai bydd rhai pobl yn cael hwn ar ôl llawdriniaeth am ganser y fron. Mae fwyaf tebygol o effeithio ar fraich. Gellir lleihau'r chwydd trwy ymarfer corff, rhwymau arbennig a thylini. Os oes gennych chwydd yn eich braich neu law, dywedwch wrth eich nyrs. Y cynharaf y caiff diagnosis o lymffoedema ei wneud, yr hawsaf fydd hi i'w drin.

I leihau'r risg o lymffoedema:

- Gofalwch am eich croen. Defnyddiwch eli croen a cheisiwch osgoi doriadau neu grafiadau ar y croen.
- Cadwch yn egniol a gwnewch ymarfer corff. Mae hyn yn helpu'r hylif lymff i symud o amgylch y corff.
- Cadwch at bwysau iach.

Newidiadau i'r esgyrn

Gall rhai therapiâu hormonaidd deneuo'r esgyrn. Efallai bydd eich meddyg yn defnyddio sgan i wirio eich esgyrn. Wedi hyn, efallai byddwch yn cael triniaeth i amddiffyn eich esgyrn.

Problemau canolbwytio a chofio

Ar ôl triniaeth am ganser y fron, efallai byddwch yn ei chanfod yn fwy anodd i ganolbwytio a chofio pethau. Fel arfer mae hyn yn ysgafn ac yn aml mae'n gwella o fewn blwyddyn o orffen y driniaeth. Siaradwch â'ch meddyg neu nyrs os ydych chi'n poeni am hyn.

Magu pwysau

Ar ôl triniaeth am ganser y fron, efallai byddwch yn magu pwysau. Efallai bydd hyn oherwydd triniaethau fel therapi hormonaidd neu steroidau. Gall rhai triniaethau ddechrau'r cyfnewid a all hefyd achosi magu pwysau. Gall eich nyrs neu feddyg roi cyngor i chi yngylch bwyta'n iach ac ymarfer corff.

Sgîl-effeithiau hwyr

Weithiau mae pobl yn cael sgîl-effeithiau o driniaeth am ganser y fron sy'n digwydd misoedd neu flynyddoedd wedi i'r driniaeth ddod i ben. Gelwir y rhain yn sgîl-effeithiau hwyr. Bydd y mwyafrif o bobl byth yn cael sgîl-effeithiau hwyr.

Bydd eich meddyg yn gallu dweud wrthych os oes yna bosibl rwydd y gallai'ch triniaeth am ganser y fron arwain at sgîl-effaith hwyr. Byddant yn gallu dweud wrthych ba arwyddion a symptomau i edrych amdanynt os oes gennych chi unrhyw bryderon.

Gwybodaeth arall

Atal Cenhedlu

Efallai y cewch eich cynghori i osgoi beichiogi am 2 flynedd ar ôl triniaeth am ganser y fron. Bydd eich meddyg yn eich cynghori i beidio â defnyddio dulliau atal cenhedlu sy'n cynnwys hormonau, gan gynnwys y bilsen a rhai coiliau.

Gallwch ddefnyddio coiliau nad ydynt yn cynnwys hormonau a dulliau atal cenhedlu rhwystr fel condomau a'r cap. Gall eich nyrs roi cyngor i chi am hyn.

Therapi amnewid hormonau

Nid yw meddygon yn argymhell therapi amnewid hormonau (HRT) ar ôl cael canser y fron. Mae HRT yn cynnwys oestrogen a allai annog celloedd canser y fron i dyfu.

Ond os oes gennych symptomau difrifol o'r cyfnewid ac nid yw unrhyw beth arall wedi helpu, efallai bydd eich meddyg yn ei ragnodi. Bydd eich meddyg yn siarad â chi am y risgiau posibl.

Dilyniant

Ar ôl i'ch triniaeth ddod i ben, efallai byddwch yn cael archwiliadau a mamogramau rheolaidd. Bydd y rhain bob ychydig o fisodd i ddechrau. Yn y pen draw, efallai mai dim ond unwaith y flwyddyn y byddwch yn eu cael. Weithiau, yn hytrach nag apwyntiadau arferol, gofynnir i chi gysylltu â'ch meddyg neu nyrs arbenigol os ydych yn poeni am unrhyw beth.

Eich teimladau

Efallai byddwch yn teimlo wedi eich llethu pan gewch wybod bod gennych ganser. Efallai bydd gennych sawl emosiwn gwahanol. Does dim ffordd gywir nac anghywir o ymateb. Mae yna sawl ffordd i ymdopi gyda hyn. Gallai siarad â ffrind agos neu berthynas helpu. Gall eich meddyg neu nyrs helpu hefyd.

Sut y gall Macmillan eich helpu chi

Mae Macmillan yma i'ch helpu chi a'ch teulu. Gallwch gael cefnogaeth gan:

- **Linell Gymorth Macmillan (0808 808 00 00).** Mae gennym gyfieithwyr, felly gallwch siarad gyda ni yn eich iaith. Dywedwch wrthym, yn Saesneg, yr iaith rydych am ei defnyddio. Gallwn ateb cwestiynau meddygol, rhoi gwybodaeth am gymorth ariannol i chi neu siarad gyda chi am eich teimladau. Gallwch ffonio 7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 8pm.
- **Gwefan Macmillan (macmillan.org.uk).** Mae gan ein safle lawer o wybodaeth yn Saesneg am ganser a byw gyda chanser. Mae mwy o wybodaeth mewn ieithoedd eraill yn macmillan.org.uk/translations
- **Gwasanaethau gwybodaeth a chefnogaeth.** Mewn gwasanaeth gwybodaeth a chefnogaeth, gallwch siarad ag arbenigwr canser a chael gwybodaeth ysgrifenedig. Chwiliwch am eich canolfan agosaf yn macmillan.org.uk/informationcentres neu ffoniwch ni. Efallai y bydd gan eich ysbyty ganolfan.
- **Grwpiau cefnogaeth lleol** – Mewn grŵp cefnogaeth, gallwch siarad â phobl eraill wedi'u heffeithio gan ganser. Dewch o hyd i grŵp gerllaw yn macmillan.org.uk/supportgroups neu ffoniwch ni.
- **Cymuned Ar-lein Macmillan** – Gallwch hefyd siarad â phobl eraill wedi'u heffeithio gan ganser ar-lein yn macmillan.org.uk/community

Rhestr geiriau

Gair Cymraeg	Yn Saesneg	Sut i'w ddweud yn Saesneg (trawslythreniad o'r gair Saesneg)	Ystyr
Adlunio'r fron	Breast reconstruction	Brêst rî-con-stryc-siyn	Pan fo meddygon yn ail-greu siâp y fron.
Atal Cenhedlu	Contraception	Con-tra-sep-siyn	Cyffuriau neu ddyfeisiadau sy'n atal beichiogrwydd.
Canser cychwynnol	Primary cancer	Prai-meri canser	Y tiwmor cyntaf i dyfu yn y corff.
Celloedd	Cells	Sels	Y blociau adeiladu bach sy'n llunio organau a meinwe ein corff.

Cemotherapi	Chemotherapy	Cemo-therapi	Triniaeth canser sy'n defnyddio cyffuriau i ladd celloedd canser.
Cyfnewid	Menopause	Men-o-pos	Pan fo corff dynes yn stopio cynhyrchu hormonau a mae ei <u>mislif</u> yn stopio.
Chwarren	Gland	Gland	Organ sy'n gwneud sylweddau sy'n helpu'r corff i weithio'n iawn, megis hormonau, chwys neu laeth.
Derbynnydd	Receptor	Rî-sep-tyr	Sylwedd ar gell sy'n caniatáu <u>proteinau</u> neu <u>hormonau</u> i effeithio ar y gell.
Diagnosis	Diagnosis	Dai-ag-nos-is	Darganfod os oes gennych salwch ai peidio.
Ffactor amddiffyn rhag yr haul (SPF)	Sun protection factor (SPF)	Syn pro-tec-siyn ffac-tyr (S-Pî-eF)	Lefel yr amddiffyniad sydd mewn cynyrrch eli haul.
Hormonau	Hormones	Hôr-mons	Sylwedd a wneir gan y corff sy'n rheoli sut mae'r organau yn gweithio.
Llawfeddygaeth	Surgery	Syr-jeri	Cael llawdriniaeth.
Mamogram	Mammogram	Mam-o-gram	Pelydr X o'r fron.
Mislif	Menstrual period	Men-striw-al pî-riod	Arllwysiad misol o waed a meinwe o'r groth.
Nodyn lymff	Lymph node	Limff nôd	Chwarren sy'n rhan o'r <u>system lymffatig</u> .
Ofariau	Ovaries	Owfarîs	Chwarennau lle cynhyrchrir oestrogen.
Protein	Protein	Protîn	Sylwedd a wneir gan y corff. Gall protein wneud i gelloedd dyfu, gan gynnwys celloedd canser.

Radiotherapi	Radiotherapy	Raydio-therapi	Triniaeth sy'n defnyddio pelydrau X ynni uchel i ddinistrio celloedd canser.
Sgan	Scan	Scan	Darlun o du mewn eich corff.
Sgîl-effeithiau	Side effects	Said eff-ects	Problem a achosir gan y driniaeth canser, megis salwch neu flinder.
Steroidau	Steroids	Ster-oids	Cyffuriau a all helpu cemotherapi i weithio'n well a rheoli sgîl-effeithiau.
Tiwmor	Tumour	Tiw-myr	Grŵp o gelloedd sy'n tyfu mewn ffordd annormal. Mae'r celloedd annormal yn lluosogi ac yn ffurfio lwmp.
Therapi amnewid hormonau (HRT)	Hormone replacement therapy (HRT)	Hôr-mon rî-pleis-ment ther- api	Triniaeth sy'n amnewid hormonau naturiol pan nad yw'r corff yn gwneud digon ohonynt.
Therapi targedig	Targeted therapy	Tar-get-îd ther- api	Cyffuriau sy'n ymosod ar gelloedd canser ac yn gwneud llai o niwed i gelloedd normal.
Therapiâu hormonaidd	Hormonal therapies	Hôr-mon-al Ther-a-pîs	Triniaethau sy'n newid cynhyrchiad neu weithgarwch hormonau yn y corff.
Y system lymffatig	Lymphatic system	Lym-ffat-ic-sus- tem	Rhwydwaith o lestri a chwarennau ledled y corff sy'n helpu i ymladd haint.

Mwy o wybodaeth yn Gymraeg

Mae gennym wybodaeth yn Gymraeg am y pynciau hyn:

Mathau o ganser	Ymdopi â chanser
<ul style="list-style-type: none">Canser y fronCanser y coluddyn mawrCanser yr ysgyfaintCanser y brostad	<ul style="list-style-type: none">Os cewch ddiagnosis o ganser – canllaw cyflymProblemau bwyta a chanserDiwedd oesCymorth ariannol - budd-daliadauCymorth ariannol – help gyda chostauBwyta'n iachBlinder a chanserSgîl-effeithiau triniaeth canserYr hyn y gallwch ei wneud i helpu'ch hun
Triniaethau <ul style="list-style-type: none">CemotherapiRadiotherapiLlawfeddygaeth	

I weld yr wybodaeth hon, ewch i macmillan.org.uk/translations

Siaradwch â ni yn Gymraeg

Gallwch ffonio Macmillan am ddim ar **0808 808 00 00** a siarad â ni yn Gymraeg trwy gyfieithydd. Gallwch siarad â ni am eich pryderon a'ch cwestiynau meddygol. Dim ond dweud Cymraeg yn Saesneg y mae angen i chi ei wneud pan fyddwch yn ffonio (dywedwch "Welsh").

Rydym ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 8pm.

Cyfeiriadau a diolchiadau

Mae'r wybodaeth hon wedi ei hysgrifennu a'i golygu gan dîm Datblygu Gwybodaeth Canser Cymorth Canser Macmillan. Mae wedi cael ei chyfieithu i'r Gymraeg gan gwmni cyfieithu.

Mae'r wybodaeth gynwysedig yn seiliedig ar wybodaeth fwy manwl, y gallwn ei hanfon atoch neu y gallwch ei darllen ar-lein. Yn Saesneg yn unig mae'r wybodaeth fwy manwl ar gael.

Mae'r wybodaeth wedi ei hadolygu gan arbenigwyr perthnasol a'i chymeradwyo gan ein Prif Olygydd Meddygol, Dr Tim Iveson, Oncolegydd Meddygol Ymgynghorol a Phrif Olygydd Meddygol Macmillan.

Gyda diolch i: Morven Angus, Prif Nyrs y Fron, Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG
Prifysgol Ysbyty Caer Colun, Rachel King, Gofal Arbenigol y Fron CSC Uned y Fron Caerwrangon, Joanna Rowley, Prif Nyrs Arbenigol y Fron Macmillan, Uned y Fron Caergrawnt.

Diolch hefyd i'r bobl y mae canser wedi effeithio arnynt a adolygodd yr wybodaeth hon.

Mae'r holl wybodaeth yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Am ragor o wybodaeth am y ffynonellau a ddefnyddiwn, cysylltwch â ni yn cancerinformationteam@macmillan.org.uk

MAC15135_Welsh



Adolygydd y cynnwys: 2018

Adolygiad arfaethedig nesaf: 2021

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth a ddarperir gennym yn gywir, ond ni ddylid dibynnu arni i adlewyrchu cyflwr presennol ymchwil feddygol, sy'n newid o hyd. Os ydych chi'n poeni am eich iechyd, siaradwch â'ch meddyg. Ni all Macmillan fod yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod sy'n deillio o unrhyw gamgymeriad yn yr wybodaeth hon na gwybodaeth trydydd parti fel gwybodaeth ar wefannau rydym yn rhoi dolenni atyn nhw.

Gobeithiwn y bydd yr wybodaeth hon o help i chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwn roi gwybodaeth a chefnogaeth i chi yn eich iaith dros y ffôn. Mae ein gwasanaethau'n rhad ac am ddim. Ffoniwch ni ar **0808 808 00 00** (7 diwrnod yr wythnos rhwng 8am a 8pm) a gofynnwch yn Saesneg am gael siarad yn eich dewis iaith.

© Cymorth Canser Macmillan 2019. Elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (261017), Yr Alban (SC039907) ac Ynys Manaw (604). Swyddfa gofrestredig 89 Albert Embankment, Llundain, SE1 7UQ.

MAC15135_Welsh

Breast cancer

This information is about breast cancer and treatments for breast cancer.

Any words that are underlined are explained in the word list at the end. The word list also includes the pronunciation of the words in English.

If you have any questions about this information, ask your doctor or nurse at the hospital where you are having treatment.

You can also call Macmillan Cancer Support on freephone **0808 808 00 00**, 7 days a week, 8am to 8pm. We have interpreters, so you can speak to us in your own language. When you call us, please tell us in English which language you need (say “xxxxx”).

There is more cancer information in [LANGUAGE] at
macmillan.org.uk/translations

This information is about:


- The breasts
- Breast cancer
- How treatment is planned
- Talking to your healthcare team
- Questions to ask about your treatment
- Treatments for breast cancer
- Possible side effects of your treatment
- Other information
- Follow up
- How Macmillan can help you
- Word list
- More information in [language]
- References and thanks

The breasts


The breasts are made of fat and tissue. They also have glands where breast milk is made. The glands are connected to the nipple by fine tubes called milk ducts. Men have a small amount of breast tissue behind the nipple.

There is breast tissue and lymph nodes (glands) in the armpits. The lymph nodes are part of the lymphatic system. There are also lymph nodes near the breastbone and behind the collarbones.

Side view of the breast



The lymph nodes near the breasts



Breast cancer

Body tissue is made up of tiny cells. Breast cancer happens when cells in the breast grow in an uncontrolled way and form a lump called a tumour (primary cancer). Sometimes, cancer cells spread to other parts of the body through the blood and lymphatic system. This is called secondary cancer.

There are different types of breast cancer, but they are treated in similar ways. Breast cancer mainly affects women. Men can also have it, but this is rare.

Breast cancer is not infectious and cannot be passed on to other people.

Stages and grades of breast cancer

- The stage of a cancer means how big it is and if it has spread.
- The grade of a cancer is how quickly the cancer may grow.

Receptors

Some breast cancer cells have receptors that hormones or proteins can attach to. These can make the cancer grow.

- **Hormones** – some breast cancers have receptors for the hormone oestrogen. These are called oestrogen-receptor positive (ER positive) breast cancers. Treatments called hormonal therapies work well for ER positive breast cancer. Breast cancers may also have receptors for the hormone progesterone.
- **Proteins** – some breast cancers have too much of the protein HER2 on the surface of the cells. They are called HER2 positive breast cancers. Your doctor may give you trastuzumab for this type of cancer. This belongs to a group of drugs called targeted therapies.

Triple negative breast cancer

Breast cancer that does not have receptors for hormones or proteins is called triple negative breast cancer.

1 in 5 women with breast cancer (20%) have triple negative breast cancer. It is more common in younger women. Your doctor or nurse can tell you more about this.

How treatment is planned

Your healthcare team will meet to plan the best treatment for you. Your doctor or nurse will then talk to you about:

- the stage and grade of the cancer
- if the cancer has hormone or protein receptors
- your general health
- the treatments and possible side effects
- what you think about the available treatments.

Talking to your healthcare team

It is important to talk about any treatment with your doctor, so that you understand what it means. After talking with you, your doctor will usually ask you to sign a form to show that you understand and agree to the treatment. This is called giving your consent. You will not be given treatment unless you have agreed to it.

It is a good idea to take someone with you who can speak both [language] and English. Or your hospital can arrange an interpreter for you. Let your nurse know if you need one.

Questions to ask about your treatment

- What does my diagnosis mean?
- What is the stage and grade of the cancer?
- What will my treatment be?
- What are the benefits, risks and side effects of each treatment?
- Will the treatment affect my daily life?
- Who can I talk to about how I am feeling?

We have more information in your language about being diagnosed with cancer.

Treatments for breast cancer

Treatments for breast cancer include:

- an operation (surgery)
- drugs (chemotherapy, hormonal therapy, targeted therapy)
- radiotherapy.

Many people have more than one type of treatment, such as an operation and then radiotherapy. Or you may have chemotherapy before or after an operation.

An operation

An operation (surgery) to remove the cancer is a common treatment for breast cancer. The doctor removes the cancer and some healthy tissue around it. The operation you have depends on the size of the cancer, where it is in the breast and what you prefer.

The doctor may talk to you about having an operation to remove:

- the cancer (wide local excision)
- the whole breast (mastectomy).

Some people also have surgery to make a new breast shape (breast reconstruction) during the operation. Others choose to have this done at a later time. You can speak to your doctor about this and the different ways of doing it. If you do not have reconstruction, your nurse can give you an artificial breast (prosthesis) to put inside your bra.

Checking the lymph nodes

During the operation, the doctor will usually remove some lymph nodes. They remove them from under your arm on the side of the cancer. This is to check if there is cancer in the lymph nodes. This helps the doctor decide if you need more treatment. The doctor or nurse will explain how the lymph nodes are removed.

If any of the nodes contain cancer, you may be offered an operation to remove the remaining lymph nodes. Some women may have radiotherapy to the lymph nodes instead of surgery.

We have more information in [language] about how surgery is planned and what to expect after the operation.

Radiotherapy

Radiotherapy uses high-energy x-rays to destroy the cancer cells. It can damage normal cells too, but these usually repair when treatment ends.

You often have radiotherapy after an operation once the wound has healed. This can reduce the risk of the cancer coming back. After a wide local excision, you usually have radiotherapy to the remaining breast tissue. Occasionally, you may have radiotherapy after a mastectomy.

You may also have radiotherapy to the armpit to treat any remaining lymph nodes.

We have more information in [language] about radiotherapy and some of the side effects you may have.

Chemotherapy

Chemotherapy uses anti-cancer drugs to destroy cancer cells. The drugs are usually given into a vein or taken as a tablet. Having chemotherapy can reduce the risk of breast cancer coming back.

Your doctor may advise you to have chemotherapy if:

- the cancer is large
- the cancer has spread to the lymph nodes
- the cancer is a higher grade
- you have triple negative breast cancer
- you have HER2 positive breast cancer.

Some people may also have chemotherapy before surgery to shrink a cancer. This usually means a smaller operation is needed.

Chemotherapy drugs can cause side effects that make you feel unwell. Different drugs can cause different side effects, including:

- being more likely to get an infection
- feeling tired
- feeling sick or being sick
- diarrhoea or constipation
- a sore mouth
- hair loss.

Your doctor can talk to you about the side effects you may have and how to manage them. Most side effects can be controlled with drugs. Most side effects go away when chemotherapy is over.

We have more information in [language] about chemotherapy and some of the side effects you may have.

Hormonal therapy

If you have an oestrogen-receptor positive (ER positive) cancer you will usually have hormonal therapy. Hormonal therapies lower the level of oestrogen or stop it attaching to the cancer cells. You usually start hormonal therapy after surgery or chemotherapy and have it for a few years.

Hormonal therapy helps to reduce the risk of the breast cancer coming back. It also helps reduce the risk of getting a new breast cancer in your other breast. Sometimes hormonal therapy drugs are given before surgery to shrink a cancer and avoid a mastectomy. You may have different drugs, such as tamoxifen, letrozole or anastrozole. This depends on:

- whether you have been through the menopause
- the risk of the cancer coming back
- how the side effects are likely to affect you.

Side effects of hormonal therapy include:

- hot flushes and sweats
- joint pain
- low sex drive.

Stopping the ovaries from working

If you have not been through the menopause, stopping your ovaries from working is another way to lower your oestrogen levels. There are two treatments that can do this:

- ovarian suppression, which stops the ovaries making oestrogen and causes a temporary menopause
- ovarian ablation, which removes the ovaries and causes a permanent menopause.

You will usually have hormonal therapy with one of these treatments.

If you are offered either of these treatments to stop your ovaries working, your doctor will give you more information and answer any questions you may have.

If you are worried about your fertility, talk with your doctor before you start treatment.

Trastuzumab

If the cancer is HER2 positive, your doctor may give you trastuzumab. This belongs to a group of drugs called targeted therapies. Trastuzumab stops the HER2 protein from making the cancer cells grow. You usually have trastuzumab every three weeks for a year. It may be given with chemotherapy, or on its own. This can be before or after surgery and radiotherapy.

The side effects are usually mild, but can include:

- a headache
- a high temperature (fever) and chills
- feeling sick.

You may have trastuzumab in combination with another targeted therapy drug called pertuzumab (Perjeta®) and a chemotherapy drug. These drugs may be given before an operation if there is a high risk of the cancer coming back.

Occasionally, trastuzumab can affect the heart. You will have tests to check your heart before and during treatment.

Bisphosphonates

Bisphosphonates are drugs that may be used in early breast cancer to:

- help protect your bones from the effects of treatments
- reduce the risk of breast cancer coming back.

Some hormonal therapy and chemotherapy drugs can cause an early menopause, which increases the risk of bone thinning (osteoporosis). Your doctor may prescribe bisphosphonates if you are at risk of bone thinning, or if you already have thinning bones.

If you have early breast cancer, bisphosphonates can sometimes lower the risk of it spreading to the bone. You have bisphosphonates for 3 to 5 years. This treatment is usually given if you have a higher risk of the cancer coming back. Your doctor or nurse can give you more information.

Possible side effects of your treatment

We have more information in [language] about common side effects of chemotherapy, radiotherapy and surgery.

Here are some other side effects that you may have during and after breast cancer treatment.

Changes to the breast

Surgery and radiotherapy to the breast can cause changes, including:

- how the breast looks and feels
- pain in the breast and under the arm
- how much you can move the arm and shoulder on the treated side.

After an operation, there will be a scar. This will usually become less obvious over time. Stretching and massaging the scar can improve this.

After radiotherapy, the skin of your breast may be darker and more sensitive. It is important to cover the area and use sunscreen with a high Sun Protection Factor (SPF) (at least SPF 30). Ask your nurse or doctor for further advice.

If you notice changes to the appearance or feel of your breast, it is best to have them checked by your doctor or specialist nurse.

Lymphoedema

Lymphoedema is a swelling caused by fluid building up in the body. Some people may have this after an operation for breast cancer. It is most likely to affect an arm. The swelling can be reduced by exercise, special bandages and massage. If you have swelling in your arm or hand, tell your nurse. The earlier lymphoedema is diagnosed, the easier it is to treat.

To reduce the risk of lymphoedema:

- Look after your skin. Use a skin cream and avoid cuts or scratches.
- Keep active and exercise. This helps lymph fluid move around the body.
- Keep to a healthy weight.

Bone changes

Some hormonal therapies can thin the bones. Your doctor may use a scan to check your bones. After this, you may be given treatment to protect your bones.

Concentration and memory problems

After breast cancer treatment, you may find it harder to concentrate and remember things. This is usually mild and often gets better within a year of finishing treatment. Talk to your doctor or nurse if you are worried about this.

Weight gain

After breast cancer treatment, you might gain weight. This may be because of treatments like hormonal therapy or steroids. Some treatments can start the menopause which can also cause weight gain. Your nurse or doctor can give you advice about healthy eating and exercise.

Late side effects

Sometimes people get side effects from breast cancer treatment that occur months or years after their treatment has ended. These are called late side effects. Most people will never have late side effects.

Your doctor can tell you if your treatment for breast cancer could lead to a late side effect. They can tell you what signs and symptoms to look for and what to do if you have any worries.

Other information

Contraception

You may be advised to avoid getting pregnant for 2 years after breast cancer treatment. Your doctor will advise you not to use contraception that contains hormones, including the pill and some coils.

You can use coils that do not contain hormones and barrier contraception such as condoms or the cap. Your nurse can give you advice about this.

Hormone replacement therapy

Doctors do not recommend hormone replacement therapy (HRT) after having breast cancer. HRT contains oestrogen which could encourage breast cancer cells to grow.

But if you have severe symptoms of the menopause and nothing else has helped, your doctor may prescribe it. Your doctor will talk to you about the possible risks.

Follow up

After your treatment has finished, you may have regular check-ups and mammograms. These will be every few months at first. Eventually you may only have them once a year. Sometimes, instead of routine appointments, you will be asked to contact your specialist if there is anything you are worried about.

Your feelings

You may feel overwhelmed when you are told you have cancer. You may have many different emotions. There is no right or wrong way to feel. There are many ways to cope with this. Talking to a close friend or relative may help. Your doctor or nurse can help too.

How Macmillan can help you

Macmillan is here to help you and your family. You can get support from:

- **The Macmillan Support Line (0808 808 00 00).** We have interpreters, so you can speak to us in your language. Just tell us, in English, the language you want to use. We can answer medical questions, give you information about financial support, or talk to you about your feelings. The phone line is open 7 days a week, 8am to 8pm.
- **The Macmillan website (macmillan.org.uk).** Our site has lots of English information about cancer and living with cancer. There is more information in other languages at macmillan.org.uk/translations
- **Information and support services.** At an information and support service, you can talk to a cancer support specialist and get written information. Find your nearest centre at macmillan.org.uk/informationcentres or call us. Your hospital might have a centre.
- **Local support groups** – At a support group you can talk to other people affected by cancer. Find a group near you at macmillan.org.uk/supportgroups or call us.
- **Macmillan Online Community** – You can also talk to other people affected by cancer online at macmillan.org.uk/community

Word list

Word (target language)	In English	How to say in English (transliteration of English word)	Meaning
	Breast reconstruction		When doctors rebuild the shape of the breast.
	Cells		The tiny building blocks that make up the organs and tissues of our body.
	Chemotherapy		A cancer treatment that uses drugs to kill cancer cells.
	Contraception		Drugs or devices that prevent pregnancy.
	Diagnosis		Finding out whether you have an illness or not.
	Gland		An organ that makes substances that help the body work properly, such as hormones, sweat or milk.
	Hormonal therapies		Treatment that changes the production or activity of hormones in the body.
	Hormones		Substance made by the body that controls how organs work.
	Hormone replacement therapy (HRT)		Treatment that replaces natural hormones when the body does not make enough.
	Lymph node		A gland that is part of the <u>lymphatic system</u> .
	Lymphatic system		A network of vessels and glands throughout the body that helps to fight infection.
	Mammogram		An x-ray of the breast.

	Menopause		When a woman's body stops producing hormones and her <u>menstrual periods</u> stop.
	Menstrual period		Monthly discharge of blood and tissue from the womb.
	Ovaries		Glands where oestrogen is made.
	Primary cancer		The first tumour to grow in the body.
	Protein		Substance that is made by the body. Proteins can make cells grow, including cancer cells.
	Radiotherapy		A cancer treatment that uses high-energy x-rays to kill cancer cells.
	Receptor		Substance on a cell that allows <u>proteins</u> or <u>hormones</u> to affect the cell.
	Scan		A picture of the inside of your body.
	Side effects		Problem caused by the cancer treatment, such as sickness or tiredness.
	Steroids		Drugs that can help chemotherapy work better and control side effects.
	Sun protection factor (SPF)		The level of protection in sunscreen products.
	Surgery		Having an operation.
	Targeted therapy		Drugs that attack cancer cells and do less harm to normal cells.
	Tumour		A group of cells that are growing in an abnormal way. The abnormal cells keep multiplying and form a lump.

More information in [language]

We have information in [language] about these topics:

Types of cancer <ul style="list-style-type: none">• Breast cancer• Large bowel cancer• Lung cancer• Prostate cancer Treatments <ul style="list-style-type: none">• Chemotherapy• Radiotherapy• Surgery	Coping with cancer <ul style="list-style-type: none">• If you are diagnosed with cancer – a quick guide• Eating problems and cancer• End of life• Financial support – benefits• Financial support – help with costs• Healthy eating• Tiredness (fatigue) and cancer• Side effects of cancer treatment• What you can do to help yourself
---	--

To see this information, go to macmillan.org.uk/translations

Speak to us in [language]

You can call Macmillan free on **0808 808 00 00** and speak to us in [language] through an interpreter. You can talk to us about your worries and medical questions. Just say [language] in English when you call (say “xxxxx”).

We are open 7 days a week, 8am to 8pm.

References and thanks

This information has been written and edited by Macmillan Cancer Support's Cancer Information Development team. It has been translated into [language] by a translation company.

The information included is based on more detailed information which we can send you or you can read online. The more detailed information is only available in English.

This information has been reviewed by relevant experts and approved by our Chief Medical Editor, Dr Tim Iveson, Consultant Medical Oncologist and Macmillan Chief Medical Editor.

With thanks to: Morven Angus, Lead Breast Nurse, Colchester Hospital University NHS Foundation Trust, Rachel King, Breast Care Specialist CNS Worcester Breast Unit, Joanna Rowley, Lead Macmillan Breast Specialist Nurse, Cambridge Breast Unit.

Thanks also to the people affected by cancer who reviewed this information.

All our information is based on the best evidence available. For more information about the sources we use, please contact us at
cancerinformationteam@macmillan.org.uk

MAC15135_Language



Content reviewed: 2018

Next planned review: 2021

We make every effort to ensure that the information we provide is accurate but it should not be relied upon to reflect the current state of medical research, which is constantly changing. If you are concerned about your health, you should consult your doctor. Macmillan cannot accept liability for any loss or damage resulting from any inaccuracy in this information or third-party information such as information on websites to which we link.

© Macmillan Cancer Support 2019. Registered charity in England and Wales (261017), Scotland (SC039907) and the Isle of Man (604). Registered office 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ.

MAC15135_Language