

WE ARE
MACMILLAN.
CANCER SUPPORT

'EU TINHA
SANGUE
NAS FEZES
E FUI AO LOGO
AO MÉDICO.'

John



O cancro do intestino é o terceiro tipo de cancro mais comum no Reino Unido. Pode afetar tanto homens como mulheres. A maioria das pessoas que têm cancro do intestino têm mais de 50 anos.

Saber quais as alterações a que deve estar atento e quando deve ir ao seu médico pode fazer uma grande diferença. Não se assuste se tiver alguns sintomas – informe o seu médico.

Consulte o seu médico se tiver algum destes sintomas:

- Sangue nas fezes (evacuação ou movimentos intestinais) durante três semanas ou mais.
- Fezes soltas ou diarreia que durem três semanas ou mais.
- Dores ou um caroço na barriga ou na passagem anal (reto).
- Sentir que não despejou completamente os intestinos depois de ir à casa de banho.
- Perder peso sem qualquer motivo óbvio.
- Sentir-se mais cansado que o habitual durante algum tempo.

A maioria das pessoas que têm estes sintomas não têm cancro do intestino – podem ser causados por outras coisas. Mas não tente auto diagnosticar-se – vá ao seu médico. No caso de ter cancro, quanto mais cedo for descoberto, mais possibilidades tem de ser tratado com êxito.

Não está a fazer o seu médico perder tempo ao verificar os seus sintomas.

Quanto mais cedo for descoberto o cancro, mais possibilidades tem de se curar.

Se precisa de apoio ou se precisa apenas de alguém com quem falar, ligue para a Macmillan através do número gratuito **0808 808 00 00** ou visite **macmillan.org.uk**