

WE ARE
MACMILLAN.
CANCER SUPPORT

«ОБНАРУЖИВ
КРОВЬ В КАЛЕ,
Я СРАЗУ
ОБРАТИЛСЯ
К ВРАЧУ».

John



Рак кишечника является третьим по распространенности видом рака в Великобритании. Это заболевание встречается как у мужчин, так и у женщин. В большинстве случаев рак кишечника обнаруживают у людей старше 50 лет.

Чтобы предотвратить серьезные проблемы, полезно знать, на какие изменения следует обратить внимание и когда вам пора идти к врачу. Симптомы — не повод для паники, но это веская причина для обследования.

Если у вас возникли любые из перечисленных ниже симптомов, обязательно обратитесь к врачу:

- кровь в стуле (кал после дефекации) в течение трех или более недель;
- более жидкий стул или диарея в течение трех или более недель;
- боль или припухлость в области живота или в заднем проходе (в прямой кишке);
- чувство, что кишечник не полностью очищается после дефекации;
- необъяснимая потеря веса;
- чувство повышенной усталости в течение некоторого времени.

У большинства людей эти симптомы не означают, что у них рак кишечника: они могут быть вызваны и другими причинами, но не пытайтесь сами ставить себе диагноз, а обратитесь к врачу. Чем раньше обнаружен рак, тем больше шансов на то, что лечение будет успешным.

Не думайте, что проверка симптомов — это пустая трата времени врача.

Чем раньше обнаружен рак кишечника, тем больше шансов на то, что лечение будет успешным.

Если вам нужна поддержка или вы просто хотите с кем-то поговорить, звоните в Macmillan по телефону бесплатной линии **0808 808 00 00** или зайдите на наш сайт **macmillan.org.uk**