

**WE ARE
MACMILLAN.
CANCER SUPPORT**

**„BRZUCH TAK MI SIĘ
POWIĘKSZYŁ, ŻE
WYGLĄDAŁAM,
JAKBYM BYŁA
W SZÓSTYM
MIESIĄCU CIĄŻY.”**

Julia



W Wielkiej Brytanii diagnozuje się raka jajnika u około 7100 kobiet rocznie. Rak jajnika występuje najczęściej u kobiet w wieku ponad 50 lat. Jeśli przynajmniej dwie bliskie krewne w rodzinie (matka, siostry lub córki) miały raka jajnika lub piersi, prawdopodobieństwo zachorowania jest wyższe.

Jeśli w większość dni przez 3 tygodnie lub dłużej występowały którekolwiek z poniższych objawów, należy zgłosić się do lekarza:

- Poczucie wzdętego (nabrzmiatego) brzucha
- Szybkie uczucie sytości lub brak apetytu
- Ból w dole brzucha lub pleców
- Konieczność częstszego niż zwykle oddawania moczu

Większość kobiet mających takie objawy nie ma raka jajnika. Jednak należy zgłosić się do lekarza, gdyż może to być rak.

Nie należy się bać, jeśli wykryje się u siebie objawy choroby – trzeba się wówczas przebadac.

Im wcześniej zdiagnozuje się raka jajnika, tym skuteczniej można go leczyć.

Nie marnuje się czasu lekarza, zgłaszając się na badanie.

Jeśli potrzebujesz wsparcia lub chcesz z kimś porozmawiać, zadzwoń pod bezpłatny numer organizacji Macmillan **0808 808 00 00** lub odwiedź stronę internetową **macmillan.org.uk**.