

**WE ARE
MACMILLAN.
CANCER SUPPORT**

**'DEPOIS DE TER DE IR
À CASA DE BANHO
TRÊS OU QUATRO
VEZES POR HORA,
DECIDI IR
AO MÉDICO.'**

John



O cancro da próstata é a forma de cancro mais comum nos homens. Mais de 41.700 homens no Reino Unido são diagnosticados com esta forma de cancro todos os anos. Corre maior risco se tem mais de 50 anos, se é de origem Africana-Caribenha ou Africana, ou se o seu pai ou irmãos já tiveram cancro da próstata.

Saber quais as alterações a que deve estar atento e quando deve ir ao seu médico pode fazer uma grande diferença. Não se assuste se tiver alguns sintomas – informe o seu médico.

Consulte o seu médico se tiver algum destes sintomas:

- Dificuldade em começar a urinar.
- Um fluxo de urina fraco.
- Necessidade urgente de urinar.
- Necessidade de urinar muitas vezes, especialmente durante a noite.

Ter alguns destes sintomas nem sempre significa que tem cancro da próstata – muitas vezes são causados por outras coisas.

Mas se tem sintomas, não os ignore – vá ao seu médico. No caso de ter cancro, quanto mais cedo for descoberto, melhor.

Não está a fazer o seu médico perder tempo ao verificar os seus sintomas.

Quanto mais cedo for descoberto o cancro da próstata, mais possibilidades tem de ser tratado com êxito.

Se precisa de apoio ou se precisa apenas de alguém com quem falar, ligue para a Macmillan através do número gratuito **0808 808 00 00** ou visite **macmillan.org.uk**