



Atezolizumab:
Traditional
Chinese (Hong
Kong)

阿替利珠單抗

甚麼是阿替利珠單抗 (Tecentriq®) ?

阿替利珠單抗用於治療某些類型的晚期（轉移性）癌症，

- 包括肺癌
- 三陰性乳腺癌
- 肝癌
- 膀胱癌
- 輸尿管和腎盂癌。

膀胱、輸尿管和腎盂癌被稱為尿道癌。

阿替利珠單抗有時可用於治療其他癌症。建議您將本資訊與我們提供的有關您所患 癌症類型的一般資訊一併閱讀。

阿替利珠單是一種免疫治療藥物。它也可以被稱為檢查點抑製劑。在您同意（同意）接受治療前，您的醫生會與您討論此治療及其可能的副作用。

阿替利珠單抗的給藥方式

您將作為門診患者在門診室接受阿替利珠單抗。阿替利珠單抗可以單獨服用，也可以與其他抗癌藥物一起服用。

治療期間，您通常會與癌症醫生、專科護士或專科藥劑師見面。他們就是我們在本資訊中所提到的醫生、護士和藥劑師。

在治療之前或治療當日，護士或經過抽血培訓的人員可能會抽取您的血液樣本。

在您接受治療之前，您將需要與醫生或護士見面。他們會告知您的血液結果，詢問您最近的身體狀況。若您的驗血結果沒有問題，藥劑師就會為您的治療做準備。

阿替利珠單抗透過靜脈滴注給藥（靜脈輸注）。您的第一次治療將需時大約 1 小時。如果您沒有任何問題，您可以在 30 分鐘內接受以下的治療。

治療過程

如何給予阿替利珠單抗取決於癌症的類型。您可能每 2、3 或 4 週注射一次。只要具有療效，您通常會一直使用，或者長達 2 年。您的醫生或藥劑師將與您討論您的治療計劃。

關於副作用

我們在此說明這種治療主要的副作用。我們同時也包括其他可能出現的副作用。

您可能會出現我們提及的某些副作用，但不太可能出現所有的副作用。如果您也服用其他抗癌藥物，則可能出現一些未被列入本文的副作用。如果您出現任何副作用，請務必告知您的醫生、護士或藥劑師。

您的醫生可以為您開藥，幫助控制一些副作用。請務必嚴格按照護士或藥劑師的指引服藥。這樣藥物可能會對您更有成效。您的護士會向您提供有關緩解副作用的建議。在治療結束後，大多數副作用將開始好轉。

嚴重或遲發性副作用

一些癌症治療可能會產生嚴重的副作用。在極少的情況下，可能會危及生命。您的醫生或護士可以為您解釋這些副作用對您的風險。

此治療可能會引起遲發性副作用。可能在治療結束後的幾週、幾個月、甚至超過一年後才出現。

如果您在治療期間或治療結束後出現任何症狀或副作用，請立即聯絡您的醫生或醫院。如果不進行治療，副作用會變得很嚴重。

您的病人提醒卡

您的醫生、護士或藥劑師會給您一張卡片，上面會有關於您治療的資訊。在治療期間和治療結束後，請務必隨身攜帶卡片。您應該向任何您需要見面的醫生或醫護專業人員出示卡片。

聯絡醫院

您的護士會給您醫院的電話號碼。若您感到不適或需要建議，不論是白天還是夜晚，您都可以隨時聯絡他們。將這些號碼儲存在您的手機中或者保存在安全的地方。

有時副作用會很快急劇惡化。如果出現新的症狀或副作用，請務必立即聯繫醫院。

更多資訊

我們無法逐一列出這種治療的所有副作用。一些罕見的副作用未被列出。您可以參閱電子藥品綱要（eMC）了解更詳細的資訊。

治療期間出現的副作用

有些人在接受治療期間或治療不久後可能出現的副作用：

過敏反應

有些患者在接受治療時會產生過敏反應。過敏反應的症狀可能

- 包括：感覺發熱或臉紅
- 發抖
- 痕癢
- 皮疹
- 感到
- 頭暈
- 頭痛
- 感到呼吸困難或喘鳴
- 面部或口腔腫脹
- 背部、腹部或胸部疼痛。

您的護士會在您接受治療期間檢查您是否出現過敏反應。若您感到不適或出現任何這些症狀，請立即告知他們。若您確實出現過敏反應，可以對您盡早進行治療。

有時候，過敏反應會在接受治療後的幾小時內發生。若您回家後出現這些症狀或感覺不適，請立即聯絡醫院。

主要副作用

某些副作用可能較為罕見。但瞭解這些副作用同樣重要。如果不進行治療，副作用會變得很嚴重。如果您在治療期間或治療結束後出現任何症狀或副作用，請立即聯絡您的醫生或醫院。這些副作用可能在治療後的幾週、幾個月、甚至超過一年後才出現。

對肺的影響

此治療可能會引起肺部的變化。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些變化，請立即聯絡您的醫生或醫院。

- 呼吸急促
- 咳嗽時
- 喘鳴
- 發燒，體溫超過 37.5°C（99.5°F）。

若任何現有的呼吸問題變得更為嚴重，那麼您也應該讓他們知道。您會接受檢測以確認您的肺功能。您可能需要類固醇或其他治療。

對肝臟的影響

此治療可能會影響您肝臟的運作方式。您將定期進行血液測試，檢查相關情況。如果血液檢查顯示肝臟有變化，醫生可能會讓您服用類固醇。

有時肝臟的變化會很嚴重。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生或醫院。

- 皮膚或眼睛發黃
- 感覺睏倦
- 尿液發黑
- （小便）。
- 不明原因的出血或
- 瘀傷、食慾不振

您可能需要類固醇或其他治療，並可能要接受監測，直到肝臟康復。

腹瀉或肚痛

您可能有腹瀉或肚痛。

如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生或醫院：

- 每天排便超過 4 次
- 夜間醒來排便
- 肚子疼痛（腹部）
- 不舒服
- 便血或大便含有粘液
- 發燒，體溫超過 37.5°C（99.5°F）。

您可能需要去醫院接受滴注（輸液）或其他治療，如類固醇。

對胰臟的影響

此治療可能會影響您胰臟的運作方式。您需要接受定期驗血以便確認您的胰臟功能。如果檢查顯示有變化，醫生可能會讓您服用類固醇或其他治療方法。

如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生或醫院：腹部

- 上方區域（腹部）出現劇烈疼痛
- 噁心和嘔吐。

對腎臟的影響

此治療可能會影響您腎臟的運作方式。這種情況並不常見，但如果不治療，可能會變得嚴重。您需要接受定期驗血以便確認您的腎臟功能。如果檢查顯示腎臟有變化，醫生可能會讓您服用類固醇或其他治療方法。

如果您在治療期間或治療結束後出現以下任何一種副作用，請立即聯絡您的醫院：

- 您完全沒有排尿（小便）。
- 尿量極少。

血糖升高

此治療可能會提高血糖水平。您將定期進行血液測試，檢查相關情況。血糖升高的症狀包括：

- 感到口渴
- 尿頻
- 感到疲倦。

如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些症狀，請立即告知您的醫生或護士。

如果您患有糖尿病，您的血糖可能高於一般水平。您的醫生會告知您如何解決。

荷爾蒙的變化

此治療可能會影響您的身體如何產生荷爾蒙。荷爾蒙控制着體內許多不同的運作。您將定期進行血液測試，檢查一些荷爾蒙的數值。您的醫生可能會給您一些藥物來控制荷爾蒙數值。您可能必須長期服用這些藥物。它們還有助減少副作用的風險，例如：

- 出汗增多
- 體重增加或減輕
- 頭暈或眩暈
- 感到比平時更餓或更渴
- 沒有性慾
- 尿頻
- 持續頭痛

如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即告知您的醫生。

皮膚變化

此治療可能會導致皮膚變化，包括：

- 紅疹
- 發癢
- 皮膚發白或出現白塊。

如果您在外面曬太陽，請使用高防晒係數（**SPF 30** 或以上）的防晒霜來保護您的皮膚。治療期間或結束後，如果您注意到任何皮膚變化，請立即告訴您的醫生或護士。您可能需要使用乳膏、類固醇或其他藥物。您的醫生可能會停止您的治療，直到皮膚變化改善。

在極少的情況下，可能會出現更嚴重的皮膚問題。您可能會出現皮疹，然後出現水泡，且皮膚會剝落。您也可能會感到不適，出現類似流感的症狀，如發熱和關節疼痛。如有以下任何症狀，請立即聯絡您的醫生或醫院。

肌肉和關節疼痛

此治療可能會導致肌肉酸痛或無力、關節僵硬、酸痛或腫脹。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生：

- 新的酸痛或疼痛
- 新的關節僵硬
- 關節腫脹或發紅。

您可能需要類固醇或其他類似止痛藥的治療。

對心臟的影響

此治療可能會影響心臟的運作方式。雖然這並不常見，但是可能會非常嚴重。您可能需要接受檢查以確認您的心臟功能。這可能會在治療之前、期間或之後進行檢查。

如果您在治療期間或治療後出現以下症狀，請撥打醫院提供的 **24** 小時電話聯絡您的醫生：

- 胸痛或胸悶
- 呼吸困難
- 眩暈
- 心率改變

這些症狀可能是由其他狀況所致，但請您務必讓醫生進行檢查，這點非常重要。如果您無法接通您醫生的電話，請撥打國民保健服務系統緊急諮詢電話**111**。

如果您的症狀是由此治療引起的，您可能需要類固醇。您可能會在醫院接受監察一段時間。

對大腦和脊髓的影響

這種治療可能會影響大腦、大腦皮層和脊髓。這種情況並不常見，但可能會很嚴重。在治療期間或治療結束後，如果出現以下情況，請立即聯絡醫生：

- 頸部僵硬
- 頭疼
- 發燒
- 發冷、嘔吐
- 眼睛對光線敏感
- 感到困惑或睏倦。

如果您的症狀是由此治療引起的，則您可能需要使用類固醇，並可能在醫院接受監察一段時間。這些症狀可能是由其他狀況所致，但請您務必讓醫生進行檢查，這點非常重要。

感覺疲憊

感到疲憊是這種治療的常見副作用。但有時疲倦是治療影響荷爾蒙或神經的信號。您可能需要針對此副作用進行治療。

如果您在治療期間或治療結束後出現以下任何一種副作用，請立即聯絡您的醫生：

- 疲倦情況惡化
- 感覺身體虛弱、站不穩

若您感覺睏倦，切勿駕車或使用機械設備。

無力、麻木、刺痛

此治療可能會影響神經。這種情況並不常見，但如果不治療，可能會變得嚴重。這些副作用一開始可能是輕微的。如果您在治療期間或治療結束後出現任何這些副作用，請立即聯絡您的醫生：

- 扣鈕扣或做其他需要手巧的工作時遇到困難
- 手臂、腿部或面部出現無力、麻木或刺痛
- 頭痛
- 身體其他部位出現無法解釋的疼痛。

您可能需要類固醇和其他治療。

其他可能的副作用

食慾不振

此治療可能會影響您的食慾。若您在一兩天內吃不多，不用太擔心。但是若食慾在幾天後沒有改善，請告知您的護士或營養師。他們會為您提供建議。他們可能會為您提供食品或飲品補充劑。

瘀傷和出血

此治療可能會減少您血液中的血小板數量。血小板是幫助血液凝結的細胞。如果血小板數量很低，您可能很容易瘀傷或出血。您可能有以下症狀：

- 流鼻血
- 牙齦出血
- 月經過多
- 尿血或便血
- 皮膚上出現看起來像皮疹的微小紅色或紫色斑點。

若您出現無法解釋的瘀傷或出血，請告知您的醫生。您可能需要接受滴注，輸入額外的血小板。這稱之為血小板輸注。

低血壓

該療法可能會導致低血壓。若您的血壓有任何問題，請告訴您的醫生或護士。您的護士會在治療期間定期檢查您的血壓。若您感覺頭暈，請告訴他們。

流感疾病

採用這種治療方法時，您可能會發燒或發冷。若出現這種情況，請告知您的醫生或護士。

感到噁心

在此治療期間您可能會感到噁心。您的醫生會給您一些抗噁心藥物來幫助預防或控制不適。請務必嚴格按照護士或藥劑師的指引服藥。預防噁心比在出現噁心後再治療要更容易。

若您感到噁心，可以小口飲用飲料並少食多餐。若您持續感覺噁心，或者在 **24 小時內**嘔吐一次或以上，請立即聯絡醫院。他們會為您提供建議並將抗噁心藥更換成對您更有效的藥物。

尿液感染

這種治療可以令您更有可能出現尿液感染或尿道感染（UTI）。若您受到了感染，請務必盡早接受治療。如果您出現 **UTI**，請立即使用您保存的 **24 小時**服務電話號碼聯絡醫院：

症狀包括：

- 更頻密地排尿
- 小便時有燒灼感
- 尿液中帶血
- 急著要去廁所小便
- 腹部或背部疼痛
- 感到顫抖
- 體溫升高。

這種治療也會影響腎臟 - 見上文。

溫體升高

這種治療可以引起溫體升高。如果您的體溫超過 **37.5°C**，請立即聯絡醫院。您的醫生可能會建議您服用撲熱息痛來降低體溫。服用撲熱息痛前務必諮詢您的醫生。

遵循癌症治療團隊為您提供的建議非常重要。

吞咽困難

這種治療可能會引致口腔疼痛或吞咽困難。若您有這樣的問題，請告訴您的醫生或護士。用醬汁或肉汁煮的食物可能較容易吞咽。或者您可以用攪拌器將一些食物變成液體。

其他資訊

血栓風險

癌症和一些癌症的治療可以增加血栓的風險。血栓的症狀

- 包括：腿部或手臂的刺痛、發紅或腫脹
- 突然呼吸急促或咳嗽
- 劇烈胸痛，且咳嗽或深呼吸時可能更嚴重。

如有任何這些症狀，請立即使用給您的 24 小時服務電話號碼聯絡醫院。如果您無法接通您醫生的電話，請撥打國民保健服務系統緊急諮詢電話**111**。

血栓雖然嚴重，但可以透過稀釋血液的藥物來治療（抗凝劑）。您的醫生或護士可以為您提供更多的資訊。

您可以透過以下方法幫助降低發生血栓的風險：

- 接受治療期間 保持活躍
- 盡量多喝液體，特別是水。

醫生可能給您開抗凝血劑，防止血栓。

其他藥物

接受此治療期間服用某些藥物可能會影響治療或有害健康。請務必告知您的癌症醫生您正在或打算服用的任何藥物，包括：

- 您的處方藥物
- 您在商店或藥店購買的藥品
- 維他命、草藥或補充療法。

請告知為您開立處方或提供藥物的醫生、藥劑師或牙醫您正在接受此癌症治療。您可以參閱電子藥品綱要（eMC）了解有關您的治療的更詳細資訊。

接種疫苗

接種疫苗可以降低您感染某些疾病的風險。您的護士或醫生會與您討論接種疫苗事宜。

醫生通常建議癌症患者接種流感疫苗和新冠病毒疫苗。這兩種都是滅活疫苗，可以幫助降低感染風險。免疫系統較弱的人可以接種這種疫苗，因為這些不是活疫苗。

若您的免疫系統較弱，請避免接種活疫苗。因為活疫苗會讓您感到不適。帶狀皰疹病毒等活疫苗含有一種非常弱的病毒。您的癌症醫生或全科醫生可以為您提供更多有關活疫苗和滅活疫苗的資訊。

避孕

您的醫生會建議您在接受治療期間，應避免讓自己或他人懷孕。藥物可能會損害胎兒的發育。治療期間，或治療結束之後的一段時間內，採取避孕措施非常重要。您的醫生、護士或藥劑師可以為您提供更詳細的相關資訊。

哺乳

治療期間，或治療結束之後的一段時間內，請勿哺乳。這是因為嬰兒會藉由母乳攝取藥物。

您的醫生或護士可以為您提供更多的資訊。

生育能力

一些抗癌藥物會影響您是否能夠懷孕或使女方受孕。若您擔心自己的生育能力，請務必在治療開始之前向您的醫生查詢。

醫療和牙科治療

若您因為癌症以外的原因需要接受治療，請務必告知醫生和護士您正在接受癌症治療。向他們出示您的病人提醒卡。向他們提供您的癌症醫生的聯絡資料，以便他們尋求建議。

若您認為需要牙科治療，請諮詢您的癌症醫生或護士。請務必告知您的牙醫您正在接受癌症治療。

幫助您獲得合適的護理和援助

如果您患有癌症並且不會說英語，您可能會擔心這會影響您的癌症治療和護理。但是您的醫療團隊應該為您提供滿足您需求的護理、援助和資訊。

我們知道，有時尋找合適的援助可能會面臨額外的挑戰。例如，如果您有工作或有家庭，可能很難抽出時間去醫院的預約。您可能還擔心金錢和交通費。所有這些都會讓人感到壓力和難以應對。

但我們可以提供幫助。我們的支援熱線可以用您的語言就您的情況提供建議。您可以與護士、經濟援助顧問、福利權益顧問和工作援助顧問交談。我們還向癌症患者提供 **Macmillan** 資助金。這些是一次性的款項，可用於支付醫院停車費、交通費、託兒所費或暖氣費等費用。

用您的母語諮詢 Macmillan

您可致電麥克米倫免費電話 0808 808 00 00 透過口譯員用您的母語與我們交談。您可以同我們討論您的憂慮和醫療問題。致電時，只需用英語告訴我們您的語言。熱線服務時間為每日上午 8 時至晚上 8 時。

審查日期：2021 年 4 月

下次審查日期：2023 年 10 月

© 麥克米倫癌症支援 2022 (Macmillan Cancer Support) 是於英格蘭和威爾士 (261017)、蘇格蘭 (SC039907) 和馬恩島 (604) 註冊的慈善機構。同時也在北愛爾蘭經營。該機構是一間有限責任公司，於英格蘭和威爾士註冊，公司編號 2400969。馬恩島公司編號 4694F。註冊登記處：89 Albert Embankment, London SE1 7UQ。增值稅號：668265007

我們盡一切努力確保我們提供的資訊是準確和最新的，但您不應該依賴這些資訊來替代針對您的情況的專業建議。在法律允許的範圍內，**Macmillan** 不承擔與使用本出版物中的任何資訊或其中包含或提及的第三方資訊或網站相關的責任。

