

Циклофосфамід

Циклофосфамід використовується для лікування різних видів раку, включаючи лімфоми, лейкози, мієлому, рак легенів і рак грудей.

Що таке циклофосфамід?

Циклофосфамід використовується для лікування раку **молочної залози**, **раку легенів**, **лейкемії**, **лімфоми** та **мієломи**. Іноді його можуть використовувати для лікування інших видів раку. Найкраще розглядати цю інформацію після ознайомлення з нашою загальною інформацією про **хіміотерапію** та **вид раку**, який виявлено у вас.

Ваш лікар поговорить з вами про це лікування та його можливі побічні ефекти, перед тим як ви надасте свою **згоду** на проведення терапії.

Як приймати циклофосфамід

Ви отримуватимете циклофосфамід у денному відділенні хіміотерапії або під час перебування у лікарні. Препарат вводитиме медсестра/медбрат відділення хіміотерапії. Циклофосфамід можна приймати разом з іншими хіміотерапевтичними препаратами.

Під час лікування ви зазвичай відвідуєте лікаря-онколога, медсестру/медбрата відділення онкології або медсестру/медбрата-спеціаліста, а також спеціалізованого фармацевта. Саме їх ми маємо на увазі, коли пишемо в цьому матеріалі слова «лікар», «медсестра/медбрат» чи «фармацевт».

В день лікування чи напередодні медсестра/медбрат або людина, навчена брати кров (флеботоміст), візьме у вас зразок крові. Це потрібно для того, щоб перевірити, чи знаходяться показники клітин вашої крові на безпечному рівні для проходження хіміотерапії.

Ви також відвідаєте лікаря або медсестру/медбрата перед хіміотерапією. Вас запитать про ваше самопочуття. Якщо результати аналізу крові хороші, фармацевт підготує ваші ліки для хіміотерапії. Медсестра/медбрат повідомить вас, коли будуть готові ваші препарати.

Перед хіміотерапією медсестра/медбрат зазвичай дає пацієнтам ліки від нудоти (**протиблювотні засоби**). Препарати хіміотерапії можуть вводити через:

- коротку тонку трубку (**канюлю**), яку вводять у вену на вашій руці або кисті;
- тонку трубку, яка проходить під шкірою грудей та вводиться у вену поруч (**центральный венозный катетер**);
- тонку трубку, яку вводять у вену на руці та проводять до вени в грудях (**периферийный венозный катетер**);
- таблетки, які слід проковтнути та запити склянкою води.

Ваша медсестра/медбрат може ввести вам циклофосфамід у вигляді повільної ін'єкції або крапельниці (вливання) у вашу канюлю або катетер. Зазвичай це робиться через помпу, що вводить препарат упродовж певного часу. Вам введуть рідину через крапельницю до та після циклофосфаміду.

Таблетки циклофосфаміду

Якщо ви приймаєте циклофосфамід у вигляді таблеток, завжди приймайте їх точно так, як вам сказали. Це важливо для того, аби забезпечити якомога більшу користь від препарату. Ковтайте таблетки цілими та запивайте склянкою води. Їх не можна розжовувати або подрібнювати. Приймайте їх на початку дня. Приймайте їх щодня в один і той же час.

Якщо ви забули це зробити, слід прийняти пропущену дозу якомога скоріше в той самий день. Якщо пройшла ціла доба, повідомте лікаря або медсестру/медбрата. Не приймайте подвійну дозу, якщо ваш лікар не сказав це робити.

Що ще треба пам'ятати про капсули:

- Мийте руки після прийому таблеток.
- Іншим слід уникати прямого контакту з препаратами хіміотерапії.
- Зберігайте їх в оригінальній упаковці при кімнатній температурі, подалі від джерел тепла та прямих сонячних променів.
- Зберігайте їх у надійному місці, непомітному та недоступному для дітей.
- Якщо одразу після прийому таблетки у вас з'являється нудота, зв'яжіться з лікарнею. Не приймайте ще одну дозу.
- Якщо ваше лікування припиняється, поверніть невикористані таблетки фармацевту.

Ваш курс хіміотерапії

Зазвичай курс лікування складається з кількох циклів і триває протягом кількох місяців. Тривалість лікування та кількість циклів залежатимуть від типу раку, від якого ви проходите лікування. Ваша медсестра/медбрат, фармацевт чи лікар обговорить з вами план лікування.

Деякі люди приймають великі дози циклофосфаміду протягом кількох днів. Це лікування проводиться перед трансплантацією стовбурових клітин.

Про побічні ефекти

В цьому розділі розповідається про найпоширеніші побічні ефекти цього лікування. Також наведено інформацію про деякі менш поширені побічні ефекти.

У вас можуть виникнути деякі з цих побічних ефектів, але малоімовірно, що всі вони можуть статися одночасно. Якщо ви проходите лікування іншими протипухлинними препаратами, у вас можуть виникнути побічні ефекти, не зазначені в цьому матеріалі. Завжди повідомляйте свого лікаря, медсестру/медбрата або фармацевта про будь-які побічні ефекти.

Ваш лікар може призначити препарати для усунення деяких побічних ефектів. Важливо приймати їх саме так, як пояснює медсестра/медбрат або фармацевт. У такий спосіб вони з більшою ймовірністю допоможуть вам. Медсестра/медбрат дасть вам поради щодо усунення побічних ефектів. Після закінчення лікування більшість побічних ефектів починає зникати.

Серйозні та загрозливі для життя побічні ефекти

Деякі методи лікування раку можуть спричинити серйозні побічні ефекти. В поодиноких випадках вони можуть бути небезпечними для життя. Ваш лікар-онколог або медсестра/медбрат може пояснити ризик виникнення цих побічних ефектів.

Зв'язок з лікарнею

Медсестра/медбрат надасть вам номери телефонів лікарні. Якщо ви погано себе почуваєте або вам потрібна порада, ви можете телефонувати за ними будь-коли цілодобово. Збережіть ці номери в телефоні або тримайте їх в іншому безпечному місці.

Додаткова інформація

Ми не в змозі перелічити всі побічні ефекти цього лікування. Існують рідкісні побічні ефекти, які не вказані у списку. Детальніше можна дізнатися в [електронному Довіднику лікарських препаратів \(eMC\)](#).

Побічні ефекти під час лікування

У деяких людей можуть спостерігатися побічні ефекти під час проведення хіміотерапії або невдовзі після неї.

Алергічна реакція

У деяких людей під час лікування виникає алергічна реакція. Ознаками такої реакції можуть бути:

- жар чи припливи;
- тремтіння;
- свербіж;
- висип на шкірі;
- запаморочення;
- головний біль;
- задишка чи хрипи;
- набряк обличчя або рота;
- біль у спині, животі чи грудях.

Під час лікування медсестра/медбрат перевірятиме наявність ознак алергічної реакції. Якщо ви погано себе почуваєте або у вас з'явилися якісь із цих ознак, одразу ж повідомте про це медсестру/медбрата. Завчасне повідомлення про таку реакцію допоможе швидко її вилікувати.

Іноді алергічна реакція виникає через кілька годин після лікування. Якщо у вас з'явились якісь ознаки або вам стало зле після повернення додому, негайно зв'яжіться з лікарнею.

Витік препарату за межі вени

Препарат може витікати за межі вени. Якщо так станеться, це може призвести до пошкодження тканин навколо вени. Така ситуація називається екстравазацією. Екстравазація не є поширеним явищем, та якщо вона виникає, важливо швидко її усунути. Негайно повідомте медсестру/медбрата, якщо у вас з'явиться відчуття печіння, біль, почервоніння або набряк навколо вени.

Біль уздовж вени

Таке лікування може викликати біль у місці введення крапельниці (інфузії) або вздовж вени. Якщо ви відчуваєте біль, негайно повідомте медсестру/медбрата або лікаря, щоб вони могли оглянути місце введення. Препарат можуть вводити повільніше або розвести його більшою кількістю рідини, щоб послабити біль.

Поширені побічні ефекти

Ризик розвитку інфекції

Це лікування може зменшити кількість білих кров'яних тілець (лейкоцитів) у вашій крові. Ці клітини протистоять інфекції. Якщо кількість білих кров'яних тілець низька, підвищується ризик зараження **інфекцією**. Низький рівень лейкоцитів іноді називають нейтропенією.

Інфекція може стати дуже серйозною загрозою, коли кількість білих кров'яних тілець низька. Важливо вилікувати будь-яку інфекцію якнайшвидше. Негайно зв'яжіться з лікарнею за наданим вам контактним номером для цілодобового зв'язку, якщо:

- у вас температура вище 37,5°C (99,5°F);
- вам раптом стало погано, навіть якщо температура нормальна;
- у вас є симптоми інфекції;
- у вас температура нижче 36°C (96,8°F).

Симптомами інфекції можуть бути:

- тремтіння та озноб;
- біль у горлі;
- кашель;
- задишка;
- діарея;
- рясне сечовипускання або дискомфорт при сечовипусканні.

Важливо дотримуватись будь-яких особливих порад, які надає вам команда з лікування раку.

Кількість білих кров'яних тілець зазвичай повертається до нормального рівня до наступного курсу лікування. Перш ніж ви продовжите лікування, вам зроблять аналіз крові. Якщо рівень лейкоцитів ще низький, ваш лікар може ненадовго відкласти лікування, доки кількість лейкоцитів не збільшиться.

Синці та кровотечі

Це лікування може зменшити кількість тромбоцитів у крові. Тромбоцити — це клітини, що допомагають крові згортатися.

Якщо кількість тромбоцитів низька, у вас можуть легко з'являтися синці або кровотечі. Серед іншого у вас можуть бути:

- носові кровотечі;
- кровоточивість ясен;
- рясні місячні;
- кров у сечі або калі;
- крихітні червоні або фіолетові плями на шкірі, які можуть виглядати як висип.

У разі безпричинної появи синців або кровотечі повідомте про це свого лікаря. Вам може бути потрібне крапельне введення додаткових тромбоцитів. Це називається **переливанням тромбоцитів**.

Анемія (низька кількість червоних кров'яних тілець)

Це лікування може зменшити кількість червоних кров'яних тілець (еритроцитів) у крові. Еритроцити розносять кисень по всьому організму. Зменшення кількості червоних кров'яних тілець називають анемією. У вас можуть бути такі симптоми:

- бліда шкіра;
- нестача енергії;
- відчуття нестачі повітря;
- запаморочення або стан переднепритомності.

Якщо у вас з'явилися ці симптоми, повідомте про це свого лікаря або медсестру/медбрата.

Якщо у вас сильна анемія, може знадобитись крапельне введення додаткових еритроцитів. Це називається **переливанням крові**.

Нудота

Щоб допомогти попередити або контролювати нудоту під час лікування, ваш лікар призначить вам ліки від нудоти. Приймайте їх точно за вказівками медсестри/медбрата чи фармацевта. Легше попередити нудоту, ніж лікувати її після того, як вона з'явилась.

Якщо ви **відчуваєте нудоту**, пийте часто маленькими ковтками та їжте регулярно невеликими порціями. Важливо пити достатньо рідини. Якщо ви продовжуєте відчувати нудоту, або у вас виникають напади блювоти частіше одного разу за 24 години, якнайшвидше зверніться до лікарні. Вам дадуть відповідні поради. Ваш лікар або медсестра/медбрат можуть замінити ліки від нудоти на ті, що вам більше підходять.

Біль у роті та горлі

Цей вид лікування може викликати **біль у роті та горлі**. Також можуть з'явитися виразки в ротовій порожнині. Це може підвищити ймовірність зараження інфекцією ротової порожнини або горла. Використовуйте м'яку зубну щітку для чищення зубів або зубних протезів уранці, ввечері та після їжі.

Якщо у вас болить у роті чи горлі:

- повідомте про це медсестру/медбрата чи лікаря — вам можуть дати ополіскувач для ротової порожнини або ліки, що полегшать ваш стан;
- намагайтесь пити багато рідини;
- не вживайте алкоголю, тютюну та продуктів, які подразнюють ротову порожнину та горло.

Іноді розсмоктування льодяників може послабити біль у роті чи горлі. Та якщо ви проходите радіотерапію голови чи шиї, не розсмоктуйте лід. Це може завдати шкоди.

Подразнення сечового міхура

Циклофосфамід може подразнювати ваш сечовий міхур і викликати дискомфорт під час сечовипускання. Вам введуть рідину через крапельницю, щоб запобігти цьому. Деяким людям також можуть призначати препарат під назвою **месна** у вигляді крапельниць (інфузії) або таблеток.

Пийте багато рідини протягом 24 годин після хіміотерапії. Намагайтесь випити принаймні 2 літри (3½ пінти).

Також важливо регулярно спорожнювати сечовий міхур і намагатися здійснювати сечовипускання, щойно ви відчуєте потребу. Негайно зверніться до лікарні, якщо ви:

- відчуваєте труднощі з сечовипусканням;
- відчуваєте будь-який дискомфорт або поколювання під час сечовипускання;
- помічаєте кров у сечі.

Діарея

Це лікування може спричинити **діарею**. Діарея означає більшу кількість випорожнень, ніж зазвичай, або водянистий чи рідкий кал. Якщо у вас сформована стома, вона функціонуватиме більш активно, ніж зазвичай.

Якщо у вас діарея:

- намагайтесь випивати принаймні 2 літри (3½ пінти) рідини щодня;
- не вживайте алкоголь, кофеїн, молочні продукти, продукти з високим вмістом жиру та клітковини;
- зв'яжіться з лікарнею.

Втрата волосся

Ваше волосся стане тоншим, або ви можете втратити все волосся на голові. Ви також можете втратити віії та брови, а також інше волосся на тілі. Випадання волосся зазвичай починається після першого або другого сеансу лікування.

Медсестра/медбрат може розказати вам, як боротися із **втратою волосся**. Є способи приховати випадання волосся, якщо ви цього хочете. Шкіра голови може бути чутливою. Важливо покривати голову, щоб захистити шкіру, коли ви перебуваєте на сонці.

Випадання волосся майже завжди носить тимчасовий характер. Після завершення лікування воно зазвичай відростає.

Відчуття втоми

Відчуття втоми — поширений побічний ефект лікування. Часто воно посилюється під кінець лікування та протягом кількох тижнів після його завершення.

Намагайтесь правильно розподіляти свої сили та планувати свій день так, щоб у вас був час на відпочинок. Легкі фізичні вправи, наприклад короткі прогулянки, можуть додати вам сил.

Якщо ви відчуваєте сонливість, не сідайте за кермо та не користуйтесь механізмами.

Вплив на нирки та печінку

Це лікування може впливати на роботу нирок і печінки. Зазвичай цей вплив помірний, і показники приходять у норму після завершення лікування. Ви здаватимете аналізи крові, щоб перевірити, наскільки добре працюють ваші нирки та печінка.

Для захисту нирок важливо випивати не менше 2 літрів (3½ пінти) рідини щодня.

Втрата апетиту

Це лікування може **вплинути на ваш апетит**. Не турбуйтеся, якщо ви не їсте багато впродовж одного-двох днів. Але якщо апетит не повертається через кілька днів або ви втрачаєте вагу, повідомте про це медсестру/медбрата чи дієтолога. Вони можуть дати вам поради. Вам можуть призначити біодобавки у вигляді їжі чи напоїв. Або ж запропонують змінити раціон харчування чи харчові звички, щоб вирішити проблему.

Менш поширені побічні ефекти

Вплив на серце

Циклофосфамід може впливати на роботу серця, але зазвичай лише тоді, коли його вводять у великих дозах. Зазвичай це є тимчасовим. Ви можете пройти обстеження, щоб перевірити, наскільки добре працює ваше серце до, під час і іноді після лікування.

Якщо лікування викликає проблеми з серцем, ваш лікар може змінити вид хіміотерапії, що застосовується.

Негайно зверніться до лікарні, якщо ви:

- відчуваєте біль або стискання в грудях;
- відчуваєте задишку або запаморочення;
- відчуваєте, що ваше серце б'ється надто швидко або надто повільно.

Такі симптоми можуть виникати через інші захворювання, однак важливо, щоб їх перевірів лікар.

Вплив на легені

Це лікування може викликати зміни в роботі легенів. Зазвичай це буває, якщо ви лікуєтеся великими дозами хіміотерапії. Рідко ці зміни можуть відбутися через 6 місяців або більше після закінчення лікування. Повідомте свого лікаря, якщо у вас з'явиться:

- кашель;
- дихання зі свистом;
- висока температура;
- задишка.

Вам слід також повідомити його в разі погіршення проблем із диханням, які виникли раніше. Вам можуть призначити обстеження, щоб перевірити роботу легенів.

Чутливі та червоні долоні рук та підшви ніг

Це називається пальмарно-плантарним синдромом або синдромом «рука-нога». Після закінчення лікування зазвичай стан шкіри покращується. Ваш лікар або медсестра/медбрат може дати вам пораду та призначити креми для полегшення симптомів. Це може допомогти:

- тримайте кисті та ступні прохолодними;
- регулярно користуйтеся зволожувальним кремом;
- не вдягайте тісні шкарпетки, взуття та рукавички.

Зміни шкіри

Це лікування може вплинути на **шкіру**. Ваш лікар чи медсестра/медбрат розкаже вам, чого чекати. Якщо ви відчуваєте сухість шкіри, спробуйте щодня користуватися зволожувальним кремом без ароматизаторів. Це лікування може викликати висип, що може свербіти.

Завжди повідомляйте свого лікаря або медсестру/медбрата про будь-які зміни шкіри. Вони можуть дати вам пораду та ліки чи креми, що полегшать ваш стан. Будь-які зміни на шкірі є зазвичай тимчасовими та проходять після завершення лікування.

Зміни нігтів

Це лікування може вплинути на ваші **нігті**. Вони можуть рости повільніше або стати ламкими. Ви можете побачити розшарування, білі або темні лінії на нігтях. Іноді нігті можуть відшаруватись чи випасти. Після закінчення лікування всі ці зміни зазвичай зникають, оскільки нігті відростають.

Догляд за нігтями:

- регулярно зволожуйте нігті та кутикулу;
- коротко підстригайте нігті;
- щоб захистити нігті, коли робите щось у будинку чи саду, носіть рукавички;
- щоб попередити розвинення інфекції, тримайте руки та нігті в чистоті, проте не мийте руки у дуже гарячій воді;
- під час проходження терапії не використовуйте накладні нігті, гелі або інші акрилові засоби, оскільки вони можуть збільшити ризик зараження;
- наносити лак для нігтів можна, але намагайтеся використовувати лак на водній основі; щоб зняти лак, не використовуйте агресивні хімічні речовини, як-от ацетон;
- якщо у вас уражені нігті на ногах, щоб зберегти їх, носите взуття, що добре сидить.

Якщо у вас з'явилися болісні відчуття або ви помітили зміни, обов'язково повідомте про це лікаря або медсестру/медбрата. Вони можуть порадити вам щось або, якщо треба, направити вас до лікаря-подолога для отримання рекомендацій щодо догляду за ногами.

Біль в очах

Очі можуть почати сльозитися або боліти. Ваш лікар може призначити краплі для очей для лікування цього. Якщо ваші очі почервоніли та запалилися, повідомте про це лікаря. Це треба зробити, оскільки вам можуть знадобитися очні краплі з антибіотиками для лікування кон'юнктивіту.

У рідкісних випадках циклофосфамід також може викликати розмитість зору та біль в очах. Якщо у вас з'явився біль в очах або ви помітили зміни в зорі, обов'язково повідомте про це лікаря або медсестру/медбрата.

Вторинний рак

Циклофосфамід може підвищити ризик розвитку вторинного раку через роки. Якщо розвивається вторинний рак, це зазвичай лейкоз.

Але користь від лікування зазвичай значно переважає цей ризик. Ваш лікар може поговорити про це з вами.

Інша інформація

Ризик утворення тромбів

Рак та деякі види лікування раку можуть підвищити ризик утворення **тромбів**.
Симптоми утворення тромбу:

- пульсуючий біль, почервоніння чи припухлість у нозі чи руці;
- раптова задишка або кашель;
- різкий біль у грудях, який може посилюватися при кашлі або глибокому вдиху.

Якщо у вас з'явилися будь-які з цих симптомів, негайно зателефонуйте в лікарню за наданим вам контактним номером для цілодобового зв'язку. Якщо ви не можете зв'язатися із лікарем, зателефонуйте за номером **термінової консультації Національної служби охорони здоров'я: 111**.

Утворення тромбу — це серйозне ускладнення, але його можна вилікувати за допомогою препаратів, які розріджують кров (антикоагулянтів). Ваш лікар або медсестра/медбрат можуть надати вам додаткову інформацію.

Ризик утворення тромбу можна знизити, якщо:

- **підтримувати активний спосіб життя** під час лікування;
- пити багато рідини, особливо води.

Щоб запобігти утворенню тромбів, вам можуть призначити антикоагулянти.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та продуктами харчування

Деякі ліки можуть впливати на ефективність цього лікування або зашкодити вам під час його проходження. Завжди повідомляйте свого лікаря-онколога про будь-які ліки, які ви приймаєте або плануєте приймати, зокрема про:

- ліки, які вам прописали;
- ліки, які ви купуєте в магазині чи аптеці;
- вітаміни, рослинні препарати та **альтернативні методи лікування**.

Повідомте інших лікарів, фармацевтів або стоматологів, які виписують або дають вам ліки, про те, що ви проходите це лікування раку.

Детальніше про своє лікування можна дізнатися в **електронному Довіднику лікарських препаратів (eMC)**.

Під час лікування циклофосфамідом слід уникати грейпфрута та грейпфрутового соку, оскільки вони можуть вступати в реакцію з препаратом.

Щеплення та вакцинація

Щеплення може зменшити ризик зараження певними інфекціями. Ваш лікар або медсестра/медбрат може розповісти вам про щеплення та вакцинацію.

Лікарі зазвичай рекомендують хворим на рак пройти щеплення вакциною від грипу та вакциною від коронавірусу (covid). Обидві вони є інактивованими вакцинами, що допомагають зменшити ризик розвитку інфекції. Вони підходять людям з ослабленою імунною системою, оскільки не є живими вакцинами.

Якщо у вас ослаблена імунна система, вам слід утримуватись від щеплення живими вакцинами. Це тому, що від них вам можете стати погано. Живі вакцини містять дуже слабку версію хвороби, від якої вас прищеплюють. Ваш лікар-онколог або терапевт може розповісти вам більше про щеплення живими та інактивованими вакцинами.

Засоби контрацепції

Ваш лікар порадить вам або вашій партнерці не вагітніти, поки ви проходите це лікування. Препарати можуть завдати шкоди плоду. Під час лікування та деякий час після його завершення важливо користуватися засобами контрацепції. Докладніше про це вам розкаже ваш лікар, медсестра/медбрат або фармацевт.

Репродуктивна функція

Деякі протираккові препарати можуть вплинути на вашу здатність **завагітніти** чи **здатність до запліднення**. Якщо ви непокоїтесь через репродуктивну функцію, важливо поговорити про це з лікарем до початку лікування.

Статеві контакти

Якщо у вас є статеві контакти під час цього лікування, вам слід користуватись бар'єрними засобами захисту, такими як презервативи або кофердами. Це захистить вашого партнера, якщо препарат потрапить до вашої сперми або вагінальної рідини.

Грудне вигодовування

Вам не рекомендується **годувати грудьми** під час лікування або протягом деякого часу після його завершення. Причина в тому, що препарати можуть потрапити до організму дитини через грудне молоко.

Ваш лікар або медсестра/медбрат можуть надати вам додаткову інформацію.

Медичне та стоматологічне обслуговування

Якщо вам необхідно звернутися до лікарні не з приводу раку, завжди повідомляйте лікарям та середньому медперсоналу про те, що ви проходите лікування раку. Повідомте їм контактні дані свого лікаря, щоб у них була можливість порадитись із ним.

Якщо вам потрібне стоматологічне лікування, проконсультуйтеся зі своїм лікарем або медсестрою/медбратом. Завжди попереджайте свого стоматолога, що ви проходите лікування від раку.

Як отримати відповідну допомогу та підтримку?

Якщо ви хворі на рак і не розмовляєте англійською, у вас може виникнути занепокоєння, що це позначиться на лікуванні раку та догляді за вами. Однак спеціалісти вашої лікувальної бригади мають надавати вам допомогу, підтримку та інформацію відповідно до ваших потреб.

Ми знаємо, що інколи люди можуть стикатись із додатковими труднощами з отриманням відповідної підтримки. Наприклад, якщо ви працюєте або маєте родину, вам може бути складно знаходити час для відвідування лікарні. Ви також можете турбуватись про гроші та транспортні витрати. Все це може викликати стрес, і впоратись із цим може бути важко.

Проте у вас є можливість звернутись по допомогу. Спеціалісти нашої лінії підтримки можуть проконсультувати вас щодо певної ситуації вашою рідною мовою. Ви можете поговорити з медсестрою/медбратом, фінансовими консультантами та спеціалістами з прав на соціальне забезпечення і з питань підтримки зайнятості. Крім того, ми надаємо хворим на рак гранти від компанії Macmillan. Це одноразові виплати, які можна використовувати для оплати паркування біля лікарні, вартості проїзду, послуг із догляду за дитиною або рахунків на опалення.

Звертайтеся до служби підтримки Macmillan своєю мовою

Ви можете безкоштовно зателефонувати до служби підтримки Macmillan за номером 0808 808 00 00 та поговорити з нами зручною для вас мовою через перекладача. Ви можете розповісти нам про свої проблеми та медичні питання. Зателефонувавши, просто скажіть англійською, яку мову ви хочете використовувати. Служба підтримки працює щодня з 8:00 до 20:00.

Переглянуто: 1 грудня 2020 р. | Наступний перегляд: 1 червня 2023 р.

© Macmillan Cancer Support 2022 р., благодійна організація, зареєстрована в Англії та Уельсі (261017), Шотландії (SC039907) та на о. Мен (604). Також здійснює діяльність у Північній Ірландії. Компанія з відповідальністю, обмеженою гарантіями її учасників, зареєстрована в Англії та Уельсі під № 2400969. Зареєстрована на о. Мен під № 4694F. Юридична адреса: 89 Albert Embankment, London SE1 7UQ. ПДВ №668265007.

Ми докладаємо максимальних зусиль для того, аби інформація, яку ми надаємо, була точною та актуальною, однак не варто покладатись виключно на неї замість отримання професійної консультації спеціаліста з урахуванням вашої конкретної ситуації. Наскільки це дозволено законом, компанія Macmillan не несе відповідальності за використання інформації, що міститься в цій публікації, або сторонньої інформації чи вебсайтів, що використані або згадуються в ній.

